

Factsheet n.	2016.131.725.02
Versione	1.0
Valida dal	14.10.2016

Raccomandazione per l'assunzione dei costi della

trapianto osteocondrale autologo (trapianto osteocondrale/mosaicoplastica)

Raccomandazione della CTM LAINF

La Commissione delle tariffe mediche LAINF raccomanda di assumere i costi del trapianto osteocondrale autologo (trapianto osteocondrale) per lesioni di spessore pieno clinicamente sintomatiche.

L'Assicurazione Militare e l'Assicurazione Invalidità hanno adottato questa decisione.

Presupposto fondamentale

Nessun presupposto specificato.

Indicazioni

Difetti ossei e della cartilagine sintomatici con una superficie fino a 2 cm² e di una profondità nell'osso superiore a 0,2 cm con assenza di copertura cartilaginea nel ginocchio. Per maggiori dettagli si rinvia alle "Empfehlungen der Arbeitsgruppe Klinische Gewebegeneration" del 2013 della "Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie" (DGOU).

Descrizione della prestazione

Il difetto cartilagineo viene chiuso con uno o più cilindri osteocondrali. Il trapianto è eseguito durante un unico intervento chirurgico durante il quale sono prelevati uno o più cilindri osteocondrali in una zona non di carico del ginocchio e impiantati nel difetto dello stesso ginocchio. Questo modo di procedere permette di chiudere il difetto cartilagineo con cartilagine di elevata qualità. Nella zona del prelevamento possono comparire disturbi. Le tecniche più vecchie con molti cilindri piccoli sono solo raramente utilizzate.

Per la scelta della procedura chirurgica osteocondrale sono determinanti la dimensione della superficie e la profondità della lesione della cartilagine in conformità alle raccomandazioni della EXPERTENDIMENTALISMO DELLA CONTRALISMO DELLA CARTILIDA DE



Factsheet n.	2016.131.725.02
Versione	1.0
Valida dal	14.10.2016

Procedura di benestare per

trapianto osteocondrale autologo (trapianto osteocondrale/mosaicoplastica)

1. Procedimenti raccomandati dalla CTM LAINF

La Commissione delle tariffe mediche LAINF raccomanda di assumere i costi del trapianto osteocondrale autologo (trapianto osteocondrale) per lesioni di spessore pieno clinicamente sintomatiche.

2. Indicazioni

Difetti ossei e della cartilagine sintomatici con una superficie fino a 2 cm² e di una profondità nell'osso superiore a 0,2 cm con assenza di copertura cartilaginea nel ginocchio. Per maggiori dettagli si rinvia alle "Empfehlungen der Arbeitsgruppe Klinische Gewebegeneration" del 2013 della "Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie" (DGOU).

3. Procedura di benestare e di fatturazione

La fatturazione si basa, a seconda del genere di soggiorno del paziente, sulle regole **TARMED** oppure **SwissDRG**.

4. Cronologia delle raccomandazioni

Nessuna raccomandazione precedente.